ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОЛИЗАТОВ ЭКСТРАКТА ПЛАЦЕНТЫ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ

А.Ш.Иноятов[1], М.М.Джаббаров[2]
Republican specialized scientific-practical medical center for dermatovenerology and cosmetology (Uzbekistan)

DOI: 10.67620/dermajournal.1730053

Красный плоский лишай (КПЛ) представляет серьезную проблему дерматологии в плане диагностики (увеличение частоты встречаемости атипичных форм дерматоза) и лечения, ввиду отсутствия эффективных терапевтических средств.

Цель исследования: обосновать и внедрить использование гидролизатов экстракта плаценты в терапии больных красным плоским лишаем.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 32 больных с КПЛ, среди которых классическая форма дерматоза установлена у 20 и атипичная (веррукозная, атрофическая и др.) – у 12 пациентов. Были проведены исследования С-реактивного белка (CRP и hs-CRP) с помощью количественного теста Finecare, показатели клеточного иммунитета (метод проточной хроматографии) и методом ИФА определены уровни про- (IL-8, TNF-α) и противовоспалительных (IL-4) цитокинов в динамике проведенной терапии. Препарат, содержащий гидролизаты экстракта плаценты, вводили внутримышечно по 2мл каждые 3 дня, на курс лечения больные получали 10 инъекций.

Применение препарата, содержащего гидролизаты экстракта плаценты, способствовало уменьшению субъективных ощущений и частичному регрессу папулезных высыпаний, как на кожных покровах, так и на слизистой полости рта, причем более выраженное при классическом, нежели при атипичном течении дерматоза. Противовоспалительный эффект препарата подтверждался достоверным ($p<0,001$) снижением С-реактивного белка, особенно hs-CRP. Гидролизаты экстракта плаценты оказывали у больных КПЛ иммуномодулирующий эффект, который подтверждался изученными в динамике показателями иммунного и цитокинового статуса.

Таким образом, красный плоский лишай отличается среди других дерматозов выраженной торпидностью в отношении проводимой терапии, повышенной частотой поражения слизистой полости рта в виде эрозивных или эрозивно-язвенных образований, в связи с чем и повышается значимость лекарственных средств, применяемых при лечении данного дерматоза. Многокомпонентность указанного препарата позволяет оказывать иммуномодулирующий, противовоспалительный и другие эффекты, лежащие в основе патогенеза красного плоского лишая.