КЛИНИКО-СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛЛЕЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

Маликова Н.Н.[1], Жураев У.О.[2]
[1,2]Ташкентский государственный медицинский университет
Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница

DOI: 10.67620/dermajournal.1730069

Ключевые слова: *буллезные дерматозы, вульгарная пузырчатка, пемфигоид, герпетиформный дерматит Дюринга, болезнь Хейли–Хейли, ретроспективный анализ.*

Введение.

Буллезные дерматозы представляют собой гетерогенную группу заболеваний кожи, характеризующихся образованием пузырей различного происхождения. Данные заболевания могут иметь хроническое и рецидивирующее течение, существенно влияя на качество жизни пациентов. Изучение нозологической структуры буллезных дерматозов имеет важное значение для совершенствования диагностики и лечебной тактики.

Цель. Изучить нозологическую структуру буллезных дерматозов по данным ретроспективного анализа историй болезни пациентов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 479 историй болезни пациентов с буллезными дерматозами, находившихся на лечении в Республиканской кожно-венерологической клинической больнице (2020-2026г.г.). Анализировалась структура основных нозологических форм буллезных дерматозов.

Результаты. В результате проведенного анализа установлено, что наиболее часто диагностируемой нозологической формой являлась вульгарная пузырчатка, доля которой составила 69% (n=331) от общего числа наблюдений. Пемфигоид выявлен в 17% (n=81) случаев. Герпетиформный дерматит Дюринга составил 12% (n=57) наблюдений, болезнь Хейли–Хейли — 2% (n=10) . Таким образом, вульгарная пузырчатка занимала основную долю в структуре изученных буллезных дерматозов.

Заключение. Ретроспективный анализ 479 историй болезни за пятилетний период показал преобладание вульгарной пузырчатки в структуре буллезных дерматозов. Пемфигоид и герпетиформный дерматит Дюринга встречались значительно реже, тогда как болезнь Хейли–Хейли составила наименьшую долю наблюдений. Полученные результаты отражают структуру буллезных дерматозов в исследуемой выборке и подчеркивают необходимость своевременной диагностики и дифференциальной диагностики данной группы заболеваний.