КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПУЗЫРЧАТКИ

Маликова Н.Н.[1], Маликова С.С.[2], Жураев У.О.[3]
[1]Ташкентский государственный медицинский университет,
[2]Центральноазиатский университет,
[3]Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница

DOI: 10.67620/dermajournal.1730070

Актуальность.
Пузырчатка представляет собой группу хронических аутоиммунных буллёзных дерматозов, характеризующихся образованием внутриэпидермальных пузырей вследствие нарушения межклеточных взаимодействий в эпидермисе. Различные клинические формы заболевания отличаются особенностями кожных проявлений и частотой поражения слизистых оболочек. Особое диагностическое значение имеет поражение слизистой оболочки полости рта, которое наиболее характерно для вульгарной формы пузырчатки.

Цель исследования.
Изучить структуру клинических форм пузырчатки и особенности поражения слизистой оболочки полости рта у пациентов с различными вариантами заболевания.

Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ клинических данных 143 пациентов с различными формами пузырчатки. Оценивались клиническая форма заболевания и наличие поражения слизистой оболочки полости рта.

Результаты.
В структуре обследованных пациентов преобладала вульгарная форма пузырчатки — 59% (n=84). Эритематозная форма выявлена у 33% (n=47), а листовидная форма — у 8% (n=12).

Поражение слизистой оболочки полости рта выявлялось преимущественно у пациентов с вульгарной формой пузырчатки. Наиболее характерными проявлениями являлись пузыри, быстро трансформирующиеся в болезненные эрозии. Поражение слизистой оболочки полости рта имело важное клиническое значение, поскольку в ряде случаев предшествовало или сопровождало появление кожных высыпаний.

Заключение.
В исследуемой группе наиболее часто встречалась вульгарная форма пузырчатки, составляя 59% всех случаев, тогда как эритематозная и листовидная формы составили 33% и 8% соответственно. Поражение слизистой оболочки полости рта преимущественно наблюдалось при вульгарной форме заболевания. Полученные результаты подчеркивают необходимость обязательного стоматологического осмотра пациентов с подозрением на пузырчатку, особенно при наличии клинических признаков вульгарной формы, что может способствовать более ранней диагностике заболевания.