ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ВИЛЬПРАФЕН» У БОЛЬНЫХ СВЕЖЕЙ ОСТРОЙ ФОРМЫ ГОНОРЕИ

Пакирдинов А.Б.[1], Кучкаров А.А.[2]
[1,2]Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан
Кафедра дерматовенерологии

DOI: 10.67620/dermajournal.1730111

Заболеваемость гонореей остается высоким во всем мире, в том числе и в нашей Республике. Надежное, быстрое и полноценное клинико-бактериологическое излечение гонореи особенно среди лиц группы риска является важной задачей венерологии, так как это приведет к санацию эпидемиологического очага и снижению заболеваемости. Отмечается рост вялотекущих, ассимптомных форм гонореи и осложнений, что связано с развитием резистентности гонококков к антибиотикам, поэтому внедрение в практическое здравоохранение для лечения гонореи новых высокоэффективных антибактериальных препаратов является актуальной задачей. К таким препаратам относится «Вильпрафен» (джозамицин) – антибиотик обладающий широким спектром действия. Препарат применяется для лечения бактериальных инфекций, бактериостатическая активность джозамицина, как и других макролидов, обусловлена ингибированием синтеза белка бактерий. При создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидное действие.

Цель исследования: Изучить клиническую эффективность препарата «Вильпрофен» у больных свежей острой формы гонореи.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 20 больных свежей острой формы гонореи. Возраст больных варьировало от 20 до 40 лет, мужчин было 15, женщин - 5. У всех больных диагноз был подтвержден лабораторно обнаружением на мазках гоноккоки Нейссера. Препарат «Вильпрафен» (джозамицин) – антибиотик обладающий широким спектром действия. Препарат применяется для лечения бактериальных инфекций, бактериостатическая активность джозамицина, как и других макролидов, обусловлена ингибированием синтеза белка бактерий. При создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидное действие.

Больным со свежей острой гонореей препарат назначался по следующей схеме:

1. В таблетках – по 500 мг 2 раза в день после еды, в течение 3-х дней, на курс лечения 3,0 препарата «Вильпрафен».

Таким образом, комплексный метод лечения, включающий препарат «Вильпрафен» способствует достижению стойкого благоприятного эффекта, положительной динамике клинической картины у больных со свежей формой гонореи, а также оказывает значительное влияние на лабораторные показатели. Учитывая эти данные, можно придти к заключению, что этот метод лечения может быть широко использован, у больных со свежей острой формой гонореи как наиболее благоприятно влияющий на течение патологического процесса.