ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ВЕРРУКАЦИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ БОРОДАВОК

Пакирдинов А.Б.[1], Фозилов Ф.А.[2]
[1,2]Андижанский Государственный медицинский институт, Кафедра дерматовенерологии

DOI: 10.67620/dermajournal.1730117

Цель: Оценить эффективность и безопасность препарата веррукацил у пациентов с аногенитальными бородавками.

Материалы и методы: 25 больных с диагнозом аногенитальные бородавки (23 женщины и 2 мужчин, средний возраст 28,5 лет) смазывали препаратом веррукацил наружно 2 раза в день в течение 3-х дней, далее 4-х дневный перерыв и вновь повторно проводили процедуры с 3-х дневным курсом лечения. Перед проведением лечения больные были осмотрены терапевтом и гинекологом (урологом), проведены необходимые лабораторные исследования (общие анализы крови и мочи, биохимическое и иммунологическое исследование крови). У всех больных наличие вируса папилломы человека подтверждено методом ПЦР. Эффективность терапии контролировалась через 15 дней.

Оценивались: переносимость препарата, результат после проведенного лечения.

Результаты: У двух пациентов (8%) отмечались побочные явления, которые проявлялись местные реакции покраснения, незначительная выраженная боль. Данная симптоматика исчезла после окончания лечения.

В процессе наблюдения через 1 месяц у 5 пациентов (20%) полностью исчезли клинические проявления. У 19 пациентов (76%) наблюдались явления регресса кондилом (уменьшение в размере). У одного (4%) отсутствовала динамика клинической картины. Через 3 месяца у 10 пациентов (40%) отмечено выздоровление, а у остальных — 15 пациентов (60%) отмечался регресс высыпаний.

Через 6 месяцев наблюдения у 20 пациентов (80%) полностью исчезла клиническая картина аногенитальных бородавок.

У 4 пациентов (16%) отмечался дальнейший регресс высыпаний, а еще у одного — рецидив высыпаний.

В контрольных исследованиях методом ПЦР у 23 пациентов (92%) получен отрицательный результат. У одного пациента, с клиническим рецидивом, лабораторное обследование дало положительный результат и еще у одного пациента без клинических проявлений тоже получен положительный результат. При повторном определении иммунного статуса у 6 пациентов из 7, имевших отклонения в иммунном статусе, отмечалась его нормализация и у одного пациента — улучшение.

Выводы: Веррукацил является эффективным препаратом для лечения больных аногенитальными бородавками, о чем свидетельствует отсутствие клинических проявлений. В подавляющем большинстве (92%) веррукацил хорошо переносится больными.