КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЭРИТЕМЫ

Пягай Г.Б.
Ташкентский государственный медицинский университет

DOI: 10.67620/dermajournal.1730123

Фиксированная лекарственная эритема (ФЛЭ) является одной из характерных форм лекарственных кожных реакций, отличительной особенностью которой служит повторное возникновение воспалительных высыпаний в одних и тех же анатомических участках при повторном контакте с причинно-значимым лекарственным препаратом. Актуальность проблемы определяется: широким распространением лекарственных средств, способных индуцировать ФЛЭ**,** включая антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики и другие широко используемые лекарственные средства, доступностью данных препаратов в аптечной сети для населения, в некоторых случаях необоснованной полипрагмазией. С учетом широкого развития фарминдустрии определенный интерес представляют современные клинико-анамнестические особенности данной патологии. На основе анализа амбулаторного приема за последние 5 лет были изучены некоторые клинико-анамнестические характеристики ФЛЭ. Всего за данный период – 2022-2026 г данный диагноз был установлен в 35 случаях. Большинство составили мужчины – 21 (60%), женщин было – 14 (40%). Возраст пациентов составил от 5 до 69 лет. По возрасту пациенты распределились следующим образом: детей до 18 лет – 3 (8,6%), 18-30 лет – 11 (31,4%), 31-40 лет – 5 (14,3%), 41-50 лет – 6 (17,1%), 51-60 лет – 17,1%, 60 и старше – 4 (11,4%). Изучение причинного фактора ФЛЭ удалось выяснить в 31 (88,6%) случаев, тогда как в 4 случаях (11,4%) возникновение заболевания было спровоцировано несколькими принимаемыми лекарственными средствами, и не позволило выделить определенный этиологический фактор. Клиническая манифестация заболевания была представлена одним очагом только в 5 (14,3%) случаях, в то время как у 30 (85,7%) пациентов наблюдались два и более очага поражения. Во всех 5 случаях с одним очагом поражения это были мужчины, и клиническая картина характеризовалась поражением кожи в области гениталий, в то время как клиническая картина у женщин носила более распространенный характер. Таким образом, исследование продемонстрировало, что большинство пациентов (80%) обратившихся на прием, были активного работоспособного возраста, дети и взрослые старше 60 лет – составили всего 20%, а клиническая картина характеризовалась в большинстве случаев множественными очагами поражения.