ОНИХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОНИХОМИКОЗОВ

А.Ж.Утаев[1], А.Б.Рахматов[2]
[1,2]Самаркандский филиал РСНПМЦДВиК МЗ РУз

DOI: 10.67620/dermajournal.1730176

Микотическая инфекция – это наиболее частая патология ногтевых пластин, поэтому лабораторное подтверждение онихомикоза необходимо для установления диагноза. Клинически микологическое поражение ногтей нередко имеет сходную картину с ониходистрофией. Обязательным этапом диагностики является микроскопия. Материалом для микроскопической диагностики служат ногтевые чешуйки. Положительные результаты культурального исследования при онихомикозах отмечаются только в 30-50% случаев. Без выяснения этиологии назначение эффективного лечения больным с поражением ногтевых пластин невозможно.

С целью проведения дифференциального диагноза дистального онихомикоза с травматическим поражением ногтевой пластинки I пальца стоп применяли дерматоскопию, при которой были выявлены неровные края поражения с продольными полосами, вызванные инвазией грибов, в отличие от травматического онихолизиса, при котором край поражения имел линейную форму без продольных полос. Острая механическая травма ногтевой пластинки часто приводит к формированию подногтевой гематомы, которую необходимо отличать от меланомы. Указания на имевшуюся травму ногтя в анамнезе не всегда достаточно, чтобы отличить гематому от меланомы. Дерматоскопия является полезным неинвазивным методом в диагностике пигментных поражений в ногте.

Меланонихия – окрашивание ногтя в коричневый или черный цвет. Меланонихия чаще всего вызывается инфекцией (грибами, бактериями) или может быть обусловлена искусственным прокрашиванием ногтя при контакте с табаком или при использовании препаратов серебра и др. При микотической меланонихии часто встречаются следующие признаки: разноцветная окраска ногтя с преобладанием желтого цвета, обратный треугольный узор, подногтевой кератоз, белые или желтые полосы, чешуйки на поверхности ногтевой пластинки. Тем не менее серый цвет, продольный рисунок и псевдопризнак Хатчинсона иногда встречается при микотической меланонихии.

Таким образом, онихоскопия дает дополнительную информацию при диагностике онихомикоза и помогает проводить дифференциальную диагностику с другими формами ониходистрофий. В сложных случаях онихоскопия является дополнительным диагностическим методом исследования.