КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬПЕНТА

ХАМИДОВ Ф.Ш.[1], АЛИЕВ Л.[2], ИСМАИЛОВА З.Ф.[3], ХАМИДОВА М.З.[4],
[1,2,3]Андижанский филиал Кокандского университета, Узбекистан,
[4]Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

DOI: 10.67620/dermajournal.1730190

Цель исследования. Изучить количественную оценку степени тяжести гнездной алопеции (Severity alopecia Tool [SalT]) у больных Alopecia areata после применения препарата Альпента.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 42 больных (18 женщин, 24 мужчин) Alopecia areata, средний возраст которых составил в среднем 30,7 лет. Всем больным диагноз Alopecia areata был поставлен после стандартного обследования. У всех больных Alopecia areata до и после комплексного лечения с применением Альпента было изучено SalT, дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ), а также изучалось состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) с помощью определения концентрации малонового диальдегида (МДА).

Результаты исследования. У всех больных Alopecia areata до комплексного лечения с применением препарата Альпента показатели SalT составили в среднем 56,3±0,13 %, индекс ДИКЖ – 26,67±0,14 балла, МДА – 4,61±0,23 нмоль/л (контрольная группа (n=10) – 1,37 нмоль/л). После комплексной терапии с применением препарата Альпента у пациентов Alopecia areata показатели SalT снизились до 20,1±0,14% и рост волос по сравнению с исходным показателем составил более 20 %. Индекс ДИКЖ после комплексного лечения у больных Alopecia areata снизился до 10,12±0,27 балла. Показатель ПОЛ у пациентов Alopecia areata после комплексного лечения снизился, и средняя концентрация МДА составила 2,13±0,12 нмоль/л.

Вывод. Исследованием было показано, что SalT лучшим образом показал эффективность проведенного комплексного лечения с препаратом Альпента у больных Alopecia areata. В данном исследовании хотя и наблюдалось снижение показателей ДИКЖ и МДА после комплексного лечения у больных Alopecia areata, но показатели SalT как указывают, полноценного изменения в положительную сторону в очаге поражения не дали.