ЭМУЛЬСИЯ EPTADERM VTLG В ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО

Хамидов Ф.Ш.[1], Алиев Л.[2], Исмаилова З.Ф.[3] Аюбова Н.М.[4], Хамидова М.З.[5]
[1,2,3]Андижанский филиал Кокандского университета, Узбекистан,
[4]Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан,
[5]Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

DOI: 10.67620/dermajournal.1730191

Цель исследования. Изучить индекс прогредиентности витилиго (Vitiligo Disease activity score) у больных витилиго в процессе лечения EPTADERM VTLG.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 80 больных с витилиго в возрасте от 18 до 53 лет (40 женщин, 40 мужчин). У всех больных было исследовано VIDa (Vitiligo Disease activity score) до и после лечения. Больные с витилиго получали в монотерапии эмульсия EPTADERM VTLG. Эмульсия EPTADERM VTLG – препарат для наружного применения. Активные компоненты: INOVEOL®EGCG - борется с клеточным окислительным стрессом, обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодулирующими свойствами, DNAGE® - защищает клеточную ДНК, защита от UVA/B, SEPITONIC™M3.0 - действует непосредственно на клеточные ферменты, обладает антиоксидантными и детоксицирующими свойствами, VIAPURE. ® - обладает противовоспалительными свойствами, антиоксидантным, антибактериальным действием, глюконат цинка - поддерживает обновление клеток, защищает ДНК, обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, антимикробными свойствами, цианокобаламин - улучшает гидратацию кожи, повышает эластичность и упругость, способствует выведению токсинов, Фенилаланин - увеличивает количество меланина синтез и восстановление пигментации у пациентов с витилиго, ниацинамид - поддерживает естественный процесс обновления клеток, улучшает гидратацию кожи, увеличивает синтез кератина и стимулирует 2 других белка: филаггрин, инволюкрин, витамин С - предотвращает окисление липидов, подавляет меланогенез и активность тирозиназы, экстракт коры магнолии - оказывает нейтрализующее действие на внутренние факторы старения кожи и оказывает противовоспалительное действие, экстракт корня солодки - обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, поддерживает проникновение других ингредиентов. Состав: Вода швейцарских ледников, Минеральное масло, Ниацинамид, Пальмитиновая кислота, Стеариновая кислота, Глицерин, Экстракт коры магнолии, Мочевина, Экстракт листьев касии крылатой, Салициловая кислота, Экстракт корня салодки, Натуральная лимонная кислота, Токоферол.

У всех больных было исследовано дерматологический индекс качество жизни (ДИКЖ), VIDa до и после лечение. Индекс прогредиентности витилиго (Vitiligo Disease activity score [VIDa]) был предложен в 1999 году учеными Njoo m.D. et al. [4]. представляет собой шестибалльную шкалу прогредиентности (активности) дерматоза, предназначенную для оценки эффективности проводимой терапии (прекращение распространения депигментации кожи). Подсчет баллов (в диапазоне от -1 до +4) основывается на личной оценке пациентом прогрессирования заболевания с течением времени. Прогрессирование витилиго характеризуется распространением (увеличением размеров) существующих очагов или возникновением новых очагов депигментации кожи. Если такие симптомы отсутствуют, состояние считается стабильным. Уменьшение величины индекса после проведенной терапии указывало на ее эффективность.

Результаты исследования. Состояние кожного процесса больные оценивали сами до и после монотерапии эмульсией EPTADERM VTLG. До лечения у больных витилиго VIDa составило 3,85±0,12 баллов. После проведения монотерапии EPTADERM VTLG индекс VIDa

снизился до 2,81±0,11 баллов. До монотерапии индекс ДИКЖ в среднем составил 27,16±2,11 балла. У больных витилиго после лечения, индекс ДИКЖ снижался незначительно и доходил в среднем до 18,12±0,14 балла. Из 80 больных с витилиго у 30 наблюдались побочные явления в виде ожога, жжения, зуда, покраснения в начале лечения, которые носили временный характер и исчезли самостоятельно на протяжении первых недель.

Вывод. Как показывает исследование, индексом VIDa хорошо оценивалось распространенность и прогредиентность у пациентов с витилиго. Снижение индексов VIDa и ДИКЖ у больных витилиго, указывало о состоянии кожного процесса глазами больного, качество жизни пациента и показало о незначительной эффективности монотерапии эмульсии EPTADERM VTLG. Препарат EPTADERM VTLG можно использовать в терапии витилиго, хотя и наблюдались побочные явления.